

Hesi PK 13/14

[< Back](#)



Abonos Hesi Coco – PK 13/14

Hesi PK 13/14 para estimular la floración. Las plantas en la fase de floración tienen una creciente necesidad de fósforo y potasio, y satisfacemos esta necesidad completamente. La fase de floración es el punto culminante en la vida de la planta. El metabolismo entonces funciona a lo máximo y se producen grandes cantidades de enzimas para la floración. La planta además alcanza más altura y por lo tanto necesita más componentes. Las materias específicas responsables de este proceso son el fósforo (enzimas y herencia) y potasio (para el transporte dentro de la planta). Para estar seguro de que no se carga la planta innecesariamente y demasiado pronto con demasiada sal, se usa Hesi PK 13/14 desde la segunda mitad de la fase de floración hasta una semana antes de la cosecha. La dosificación se incrementa paso a paso durante las últimas semanas de la fase de floración.

PK 13/14 está ajustado a Hesi Floración Hidro y Hesi Coco.

Composicion: Abonos PK 9 – 7

Fósforo 9,0 % P_2O_5

Potasio 7,2 % K_2O

Dosificación:

Comenzando desde la 2a mitad de la fase de floración: empiece con la dosis más baja. (2,5 ml / 10 L)

Aumente la dosis gradualmente hasta el máximo. (15 ml / 10 L)

PK 13/14 se encuentra a la venta en envases de: 500 ml, 1 L, 5 L, 10 L y 20 L.